

АЛГОРИТМ ПРОГРАММЫ



ШАГ 1

Зарегистрируйтесь в программе, позвонив по телефону бесплатной горячей линии **8-800-775-06-17** (пн-пт с 4:00 до 21:00 по МСК), или на сайте **onco-gema.mbcon.ru**, или отсканируйте **QR-код** на обложке брошюры



ШАГ 2

Оформите заявку в личном кабинете на сайте **onco-gema.mbcon.ru**

1. Отсканируйте или сфотографируйте заполненный **бланк ИС пациента**
2. Загрузите изображение в соответствующую форму в личном кабинете при заполнении заявки



Дождитесь звонка оператора горячей линии с подтверждением Вашей заявки, **и только затем переходите к следующему шагу**



ШАГ 3

Вариант 1

Подготовьте биоматериал и передайте его курьеру
Отправка 1. Пробирки/эппендорфы с **замороженной цитратной плазмой** — **3 шт.**
Отправка 2. Пробирка **ЭДТА** с цельной кровью — **1 шт.**



ШАГ 3

Вариант 2

Передайте представителю пациента комплект сопроводительных документов для посещения офиса ИНВИТРО:
1. ИС пациента
2. Направление на исследование
3. Карточку пациента с номером телефона для связи с горячей линией



Получите результаты исследований

О готовности результата Вам сообщит оператор горячей линии, после чего Вы сможете ознакомиться с ним в личном кабинете или запросить на электронную почту




ВНИМАНИЕ!

Без приложенных к биоматериалу **направления и ИС пациента** диагностика проводится **НЕ будет**


ТТП-SCAN

Программа диагностики врожденной Тромботической Тромбоцитопенической Пурпуры


Информация
для врача



Аритмия, инфаркт миокарда, боль в груди



Инсульт, судороги, потеря сознания, изменения поведения, спутанность сознания



Острое повреждение почек, снижение рСКФ



Телефон горячей линии программы

8-800-775-06-17

пн-пт с 4:00 до 21:00
по московскому времени



QR-код
для регистрации
в программе



Врожденная тромбоцитическая тромбоцитопеническая пурпура (ВТПП)

— редкое жизнеугрожающее заболевание, сопровождающееся **летальностью до 90%** при отсутствии адекватного лечения^{1,2}

КАКАЯ СИМПТОМАТИКА ДОЛЖНА ВАС НАСТОРОЖИТЬ?



1. Жалобы на слабость, утомляемость, головную боль, снижение внимания, аритмию, боли в груди, лихорадку или другие проявления ишемии




2. При осмотре: бледность и/или желтушность кожных покровов, кровоподтеки, геморрагическая сыпь




3. Пункты 1 и 2 в сочетании с лабораторными изменениями: комбинация тромбоцитопении и гемолитической анемии

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

своевременная диагностика ВТПП у пациентов-детей (0-18 лет)



В рамках программы проводится каскад исследований:



Если ранее была выявлена **активность ADAMTS13 менее 10%**, то диагностика начнется со 2-го этапа (необходимо предоставить соответствующий документ)

Бесплатная горячая линия программы диагностики ТТП-SCAN

8-800-775-06-17

пн-пт с 4:00 до 21:00 по московскому времени

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Необходимо соответствие **ВСЕМ** критериям:



Пациенты-дети (0-18 лет) с гражданством РФ



Тромбоцитопения (количество **тромбоцитов меньше 100*10⁹/л**)



Анемия (**гемоглобин меньше 100 г/л**)



Повышение ЛДГ в **1,5 раза** и более от верхней границы нормы



Отрицательная прямая проба Кумбса



Подписанная родителем/законным представителем **форма информированного согласия (ИС)** на обработку персональных данных и участие в программе

ПОДГОТОВКА БИОМАТЕРИАЛА ДЛЯ ОТПРАВКИ

ОТПРАВКА 1

Три пробирки / эппендорфа с замороженной цитратной плазмой

Забор крови строго до переливания плазмы и проведения плазмафереза

- Использование пробирок с **цитратом натрия**
- Вакуумный способ забора венозной крови
- Центрифугирование (3000g) забранной крови не позднее часа после забора
- Заморозка плазмы при температуре -20°C (требуется время на заморозку!)
- Хранение замороженных аликвот с цитратной плазмой при температуре -20°C




ОТПРАВКА 2 (если ингибитор отсутствует)

Одна пробирка ЭДТА с цельной кровью

Забор крови в день отправки

- Использование пробирки **ЭДТА**
- Вакуумный способ забора венозной крови
- Хранение при температуре +2+8 °C



ЛДГ — лактатдегидрогеназа; ЭДТА — этилендиаминтетрауксусная кислота.
ADAMTS13 (A Disintegrin And Metalloprotease with ThromboSpondin type 1 motif) — это дисинтегрин-подобная металлопротеиназа с мотивом тромбоспондина 1, являющаяся первичным молекулярным регулятором тромбоцитосвязывающей активности фактора фон Виллебранда.
1. Накастов И. М., Авдонин П. П., Грибанова Е. О., Калинин Н. Н. и соавт. Гематология и трансфузиология. 2018; 63(2): 191—199 doi: 10.25837/ HAT.2018.39.2.010
2. Галстян Г. М., Клебанова Е. Е. Терапевтический архив. 2020; 18:207-2017. DOI: 10.26442/00403660.2020.12.200508.